



Subsecretaría de Salud Pública  
División Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones



58  
RR/PGE/MPBA/MAV/MBI/mnh

2109

ORDINARIO B27 N° \_\_\_\_\_/

ANT.: Ordinario B27/N°4967 de diciembre de 2021. Subsecretaría de Salud Pública.

MAT.: Recomendación de sitios de punción de vacunas del PNI.

SANTIAGO, 13 JUN 2023

DE : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA  
A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el proceso de mejora continua del Departamento de Inmunizaciones y dado la incorporación de la nueva vacuna meningocócica recombinante (serogrupo B), al calendario de vacunación 2023, se actualiza la recomendación de los sitios de punción de las vacunas programáticas y de campaña Influenza.

Esto tiene por objetivo facilitar las estrategias de vacunación, así como realizar el seguimiento de los Errores Programáticos (EPRO) o Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunas e Inmunizaciones (ESAVI), dado esto se recomienda estandarizar los sitios de punción y vía de administración, según la siguiente tabla:

"Recomendaciones de sitios de punción y vías de administración de vacunas según edad"

Edad	Muslo Derecho	Muslo Izquierdo	Brazo Derecho	Brazo Izquierdo
Recién Nacido		Hepatitis B (IM)		BCG (ID)
2 - 4 meses	Hexavalente (IM) + Neumocócica conjugada (IM)	Meningocócica B (IM)		
6 meses	Hexavalente (IM)	Neumocócica conjugada (IM)* + Influenza (IM)		
12 meses			Neumocócica conjugada (IM) + Meningocócica tetravalente (IM)	SRP (SC) + Influenza (IM)
18 meses			Hexavalente (IM) + Varicela (SC)	Hepatitis A (IM) + Influenza (IM)
18 meses Isla de Pascua		Influenza (IM)	Hexavalente (IM) + Varicela (SC)	Hepatitis A (IM) + Fiebre Amarilla (SC)
36 meses			Varicela (SC)	SRP (SC) + Influenza (IM)

\* Prematuros, menores de 37 SG

Fuente: Elaboración propia Departamento de Inmunizaciones

En el caso de las vacunas contra Varicela y SRP de los 36 meses, ambas corresponden a vacunas de virus vivos atenuados, por lo que deben ser administradas de forma **simultánea o con un intervalo de 4 semanas.**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



**ANDREA ALBAGLI IRURETAGOYENA**  
**SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA**

**Distribución:**

- Secretarios Regionales Ministeriales del país
- Directores de Servicio de Salud del país
- Encargados PNI de las Seremis del país
- Encargadas PNI de los Servicios de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Vacunas e Inmunizaciones
- Subdepartamento de Farmacovigilancia ISP
- Asistencia Remota en Salud
- Oficina de Partes



94

Subsecretaría de Salud Pública  
 División Prevención y Control de Enfermedades  
 Departamento de Inmunizaciones  
 ET/ASR/CGC/M/VI/MRI/mnh

ORDINARIO B27 N° 4967

ANT.: Ordinario N27 N° 3391 de agosto de 2020.

MAT.: Recomendación de sitios de punción de vacunas del PNI.

SANTIAGO, 21 DIC 2021

DE : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN

En el proceso de mejora continua del Departamento de Inmunizaciones de acuerdo al desarrollo de nuevas estrategias e incorporación de nuevas vacunas al calendario, y con el objetivo de facilitar el seguimiento de los Errores Programáticos (EPRO) o Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunas e Inmunizaciones (ESAVI), se recomienda estandarizar los sitios de punción y vía de administración, según la siguiente tabla:

“Recomendaciones de sitios de punción y vías de administración de vacunas según edad”


Edad	(Muslo Derecho)	(Muslo Izquierdo)	(Brazo Derecho)	(Brazo Izquierdo)
Recien Nacido	-	Hepatitis B (Intramuscular)	-	BCG (intradérmica)
2 – 4 meses	Hexavalente (Intramuscular)	Neumocócica conjugada (Intramuscular)	-	-
6 meses	Hexavalente (Intramuscular)	Neumocócica conjugada (Intramuscular)* + Influenza (Intramuscular)	-	-
12 meses	-	-	Neumocócica conjugada (Intramuscular) + Meningocócica (Intramuscular)	SRP (Subcutánea) + Influenza (Intramuscular)
18 meses	-	-	Hexavalente (Intramuscular) + Varicela (Subcutánea)	Hepatitis A (Intramuscular) + Influenza (Intramuscular)
18 meses Isla de Pascua	-	Influenza (Intramuscular)	Hexavalente (Intramuscular) + Varicela (Subcutánea)	Hepatitis A (Intramuscular) + Fiebre Amarilla (Subcutánea)
36 meses	-	-	Varicela (Subcutánea)	SRP (Subcutánea) + Influenza (Intramuscular)

\*Prematuros, menores de 37 semanas.

Fuente: Elaboración propia Departamento de Inmunizaciones

En el caso de las vacunas contra Varicela y SRP de los 36 meses, ambas corresponden a vacunas vivas atenuadas, por lo que deben ser administradas de forma **simultánea o con un intervalo de 4 semanas.**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



**Distribución:**

- Secretarios Regionales Ministeriales del país
- Directores de Servicio de Salud del país
- Encargados PNI de las Seremis del país
- Encargadas PNI de los Servicios de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Vacunas e Inmunizaciones
- Subdepartamento de Farmacovigilancia ISP
- Asistencia Remota en Salud
- Oficina de Partes