



Subsecretaría de Salud Pública  
División Prevención y Control de Enfermedades  
Departamento de Inmunizaciones  
MMR/FGE//MPVA/RSS/MAV/mnh



67  
[Handwritten signatures]

3497

ORD B27N° \_\_\_\_\_/

ANT.: Decreto Exento N° 68 del 30 de diciembre de 2021, Ord. B27 N° 4791 del 07 de diciembre de 2021, Ord. B27 N° 4966 del 21 de diciembre de 2021, R.E. N° 124 del 26 de enero de 2022, "Lineamientos Técnico Operativos Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Parotiditis" R.E. N° 125 del 26 de enero de 2022, "Lineamientos Técnico Operativos Vacunación Varicela",

**MAT.:** Refuerza vacunación programática a los 36 meses, Varicela y Sarampión, Rubéola, Parotiditis.

28 JUL 2022

SANTIAGO,

DE : SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA

A : SEGÚN DISTRIBUCION

El Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, inicio a contar del 03 de enero de 2022 la vacunación de los **pre escolares a los 36 meses** de vida con la 2° dosis de vacuna contra Varicela y Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP).

Vacuna Varicela

En junio de 2019, el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunizaciones (CAVEI) recomienda incorporar la vacuna varicela monovalente cepa Oka en esquema de dos dosis. La primera dosis, entre los 12 y 18 meses. La segunda dosis, antes del ingreso a la educación preescolar<sup>1</sup>.

La vacunación contra la varicela dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones se inició el 1 de julio de 2020, con la administración de 1° dosis a los lactantes de 18 meses en los vacunatorios públicos y privados en convenio del país. En los "Lineamientos técnicos operativos vacuna contra varicela"<sup>2</sup> de ese año, se definen además que la 2 dosis del esquema se implementara el año 2022.

Vacuna Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP)

El objetivo es garantizar la protección temprana de la población infantil para disminuir el riesgo de hospitalización y morbilidad causada por los virus del Sarampión, Rubéola y Parotiditis.

<sup>1</sup> [https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAVEI-Vacuna-contra-Varicela\\_31Julio2019\\_final.pdf](https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/08/CAVEI-Vacuna-contra-Varicela_31Julio2019_final.pdf)

<sup>2</sup> <https://vacunas.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/08/R.E.-N%C2%BA-664-Lineamientos-Varicela.pdf>

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que un esquema de vacunación infantil contra Sarampión debe considerar dos dosis y que, para alcanzar la eliminación del virus, las coberturas de vacunación deben ser, al menos de 95%.

Según el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), la edad de vacunación con SRP debe lograr el balance entre dos factores: la edad más temprana en la que puede obtenerse la mayor seroconversión y el grupo etario con el mayor riesgo de infección

Se envían coberturas por región del 1° semestre de 2022

COBERTURAS AL 30-06-2022	36m			36m		
	SRP2D	POB. OBJ.	% COB.	VARICELA2D	POB. OBJ.	% COB.
<b>Región</b>						
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>12.119</b>	<b>108.988</b>	<b>11,10%</b>	<b>29.637</b>	<b>108.988</b>	<b>27,20%</b>
De Arica y Parinacota	103	1.466	<b>7,00%</b>	189	1.466	<b>12,90%</b>
De Tarapacá	183	2.502	<b>7,30%</b>	518	2.502	<b>20,70%</b>
De Antofagasta	360	3.909	<b>9,20%</b>	1.166	3.909	<b>29,80%</b>
De Atacama	352	1.751	<b>20,10%</b>	440	1.751	<b>25,10%</b>
De Coquimbo	536	4.526	<b>11,80%</b>	1.448	4.526	<b>32,00%</b>
De Valparaíso	1.280	10.124	<b>12,60%</b>	2.940	10.124	<b>29,00%</b>
Metropolitana	4.577	47.146	<b>9,70%</b>	11.494	47.146	<b>24,40%</b>
Del L.B. O'Higgins	881	5.681	<b>15,50%</b>	2.211	5.681	<b>38,90%</b>
Del Maule	718	6.417	<b>11,20%</b>	2.281	6.417	<b>35,50%</b>
De Ñuble	208	2.582	<b>8,10%</b>	1.052	2.582	<b>40,70%</b>
Del Biobío	1.015	8.671	<b>11,70%</b>	2.743	8.671	<b>31,60%</b>
De La Araucanía	680	5.874	<b>11,60%</b>	486	5.874	<b>8,30%</b>
De Los Ríos	339	2.030	<b>16,70%</b>	656	2.030	<b>32,30%</b>
De Los Lagos	703	4.838	<b>14,50%</b>	1.510	4.838	<b>31,20%</b>
De Aysén	59	578	<b>10,20%</b>	255	578	<b>44,10%</b>
De Magallanes	125	893	<b>14,00%</b>	248	893	<b>27,80%</b>

Fuente RNI 30 06 2022

De acuerdo a este análisis y con el fin de fortalecer esta estrategia para lograr las más altas coberturas, en población de preescolares durante este año, se solita la máxima difusión de esta vacunación contra Varicela y SRP, a los 36 meses de vida, a los equipos de la red de salud, así como **generar los planes regionales y locales** para realizar rescate y puesta al día de este grupo objetivo, considerando las siguientes recomendaciones:

- Ambas vacunas corresponden a vacunas vivas atenuadas, por lo que a los 36 meses deben ser administradas de forma simultánea o separadas por 4 semanas.
- Si un pre-escolar cuenta con esquema completo (2 dosis de vacuna SRP), no requieren más dosis
- Si se verifica en el Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) que un pre-escolar **mayor de 3 años** cuenta con una dosis de vacuna SRP, se debe poner al día con su 2ª dosis.
- La cohorte de niños nacidos a partir del 1° de enero del 2019, deben ponerse al día con vacuna varicela en la primera oportunidad que sea posible, de acuerdo al siguiente esquema:

1° dosis	2° dosis
18 meses	36 meses
19 a 33 meses	36 meses
34 a 36 meses	Intervalo de 3 meses entre 1° y 2° dosis

Se reitera la importancia de realizar amplia difusión de este documento, con el fin de que esta información sea conocida por todos los niveles y equipos de salud, así como los padres, tutores o cuidadores de estos pre escolares.

Saluda atentamente,



**DR. CRISTOBAL CUADRADO NAHUM**  
**SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretarías/os Regional Ministerial de Salud
- Directoras/es Servicio de Salud.
- Encargada Programa Nacional de Inmunizaciones SEREMI de Salud del país.
- Encargada Programa Nacional de Inmunizaciones Servicio de Salud del país.
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Departamento de Ciclo Vital
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes y Archivo