



115

Subsecretaría de Salud Pública
División Prevención y Control de Enfermedades
Departamento de Inmunizaciones
FBR/FCI/MPBA/CPG/MAV/mnh



4257

ORD B27N° _____

ANT.: RES EX ISP N°5365/2023 Resuelve solicitud de Pfizer Chile S.A. para modificar la autorización de importación según Artículo N° 99.

MAT.: Informa vacunación contra COVID -19

SANTIAGO,

20 OCT 2023

DE : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

A : SEGÚN DISTRIBUCION

El Ministerio de Salud, con la finalidad de proteger a la población chilena frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, ha desarrollado un conjunto de estrategias en base a la evidencia, para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19.

En este contexto, se invita a la población general desde los 12 años en adelante en especial los de ≥60 años y con comorbilidades, que han cumplido 12 meses de la última dosis de vacuna COVID -19, a recibir una dosis de vacuna COVID-19 bivalente.

Considerando la autorización de esquema primario de vacuna COVID-19 bivalente de laboratorio Pfizer-BioNTech, se informa la actualización del documento "Vacunación contra SARS-CoV-2 desde los 6 meses en adelante":

1. Actualización de estrategia de vacunación en población general desde los 6 meses

Tabla N°1: Vacunación actualizada de 6 meses a 35 meses de edad*.

Historial de vacunación	Vacuna	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	No dosis			
1 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

Tabla N°2: Vacunación actualizada de 3 años a 4 años (4 años 11 meses 29 días) *.

Historial de vacunación	Vacuna	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 2 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	No dosis			
Al menos 1 dosis de vacuna monovalente y 1 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

Tabla N°3: Vacunación actualizada a los 5 años (5 años 11 meses 29 días) *.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado**	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 2 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	No dosis			
Al menos 1 dosis de vacuna monovalente y 1 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

** De acuerdo con la recomendación de CAVEI, usar preferentemente vacuna de plataforma ARNm.

Tabla N°4: Vacunación actualizada a los 6 años a 11 años (11 años 11 meses 29 días) *.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 2 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	No dosis			
Al menos 1 dosis de vacuna monovalente y 1 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

** De acuerdo con la recomendación de CAVEI, usar preferentemente vacuna de plataforma ARNm.

Tabla N°5: Vacunación actualizada de 12 años hasta 64 años (64 años 11 meses 29 días) *.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	28 días
Al menos 2 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	Al menos 8 semanas después de la última dosis monovalente (independiente si es esquema primario o dosis de refuerzo)
1 dosis de vacuna bivalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	Al menos 12 meses después de la primera dosis de una vacuna de ARNm bivalente
2 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

**Como alternativa se puede utilizar CoronaVac en aquellos casos que esta contraindicada vacuna de plataforma ARNm.

Tabla N°6: Vacunación actualizada de 65 años en adelante*.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	28 días Intervalo mínimo entre dosis bivalente es de 4 meses
Al menos 2 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	Al menos 8 semanas después de la última dosis monovalente (independiente si es esquema primario o dosis de refuerzo) Intervalo mínimo entre dosis bivalente es de 4 meses
1 dosis de vacuna bivalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	Al menos 4 meses después de la primera dosis de una vacuna de ARNm bivalente
2 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

**Como alternativa se puede utilizar CoronaVac en aquellos casos que esta contraindicada vacuna de plataforma ARNm.

2. Actualización de estrategia de vacunación en población inmunocomprometida desde los 6 meses.

Para el caso de los inmunocomprometidos, al esquema primario se le agrega una dosis adicional, y se continúa según las tablas siguientes:

Tabla N°7: Vacunación actualizada de 6 meses a 35 meses de edad inmunocomprometido*.

Historial de vacunación	Vacuna	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	CoronaVac	3 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
3 dosis de vacuna monovalente	No dosis			
1 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
3 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

Tabla N°8: Vacunación actualizada de 36 meses a 4 años inmunocomprometido (4 años 11 meses 29 días) *.

Historial de vacunación	Vacuna	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	CoronaVac	3 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 3 dosis de vacuna monovalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
3 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

Tabla N°9: Vacunación actualizada de 5 años (5 años 11 meses 29 días) inmunocomprometido*.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	3 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	3 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 3 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
3 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

** De acuerdo con la recomendación de CAVEI, usar preferentemente vacuna de plataforma ARNm.

Tabla N°10: Vacunación actualizada de 6 años a 11 años (11 años 11 meses 29 días) inmunocomprometido*.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	3 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	3 dosis	0,5 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
Al menos 3 dosis de vacuna monovalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	Al menos 20 semanas después de la última dosis
1 dosis de vacuna bivalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	2 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	2 dosis	0,5 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	Pfizer-BioNTech monovalente pediátrica	1 dosis	0,2 mL	28 días
	CoronaVac	1 dosis	0,5 mL	28 días
3 dosis de vacuna bivalente	No dosis			

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

** De acuerdo con la recomendación de CAVEI, usar preferentemente vacuna de plataforma ARNm.

Tabla N°11: Vacunación actualizada desde 12 años inmunocomprometido*.

Historial de vacunación	Vacuna**	Esquema de vacunación	Dosis	Intervalo entre dosis
No vacunado	BNT162 bivalente	3 dosis	0,3 mL	28 días
1 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	28 días
2 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	28 días Intervalo mínimo entre dosis bivalente es de 8 semanas
Al menos 3 dosis de vacuna monovalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	Al menos 8 semanas después de última dosis monovalente (independiente si es esquema primario o dosis de refuerzo) Intervalo mínimo entre dosis bivalente es de 8 semanas
Al menos 3 dosis de vacuna monovalente, y 1 dosis de vacuna bivalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	Al menos 8 semanas después de última dosis bivalente
1 dosis de vacuna bivalente	BNT162 bivalente	2 dosis	0,3 mL	28 días
2 dosis de vacuna bivalente	BNT162 bivalente	1 dosis	0,3 mL	28 días
3 dosis de vacuna bivalente			No dosis	

*La vacuna bivalente contra COVID-19 se encuentra actualizada de acuerdo con las evidencias epidemiológicas.

**Como alternativa se puede utilizar CoronaVac en aquellos casos que esta contraindicada vacuna de plataforma ARNm.

Sin otro particular, saluda atentamente,



ANDREA ALBAGLI IRURETAGOYENA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

DISTRIBUCIÓN:

- Secretarías/os Regional Ministerial de Salud del país
- Directoras/es Servicio de Salud del país
- Referente PNI SEREMI de Salud del país
- Referente PNI Servicio de Salud del país
- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Redes Asistenciales
- DIPRECE
- DIVAP
- Asistencia Remota en Salud
- Sección Farmacovigilancia de Vacunas
- Departamento de Inmunizaciones
- Oficina de Partes y Archivo