

CONDUCTAS PARA SEGUIR EN EPRO POR VACUNA MENINGOCÓCICA SEROGRUPO B – BEXSERO®

Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
Se administró una dosis (mL) incorrecta	Administración de dosis menor a la indicada (Ej.: derrame, filtración, etc.)	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Se debe repetir dosis en 1 mes, posterior a dosis EPRO.	No
Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta	Administración de vacuna en grupo etario no autorizado - Menor de 2 meses	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Administrar dosis en edad correcta	No
Vacuna fuera de fecha de vigencia	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	Se debe repetir dosis en 1 mes, posterior a dosis EPRO.	No
Administración de dosis extra	Repetición de una dosis ya administrada del esquema.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Seguimiento	No
Intervalo incorrecto	Administración de segunda dosis en un intervalo menor a 2 meses (8 semanas)	Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Tipo de EPRO		Indicación			
No se respetó una contraindicación de la vacuna		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Vacuna fuera de rango de temperatura		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de vacuna en sitio de punción incorrecto		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de vacuna por vía incorrecta		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Información adicional					
Seguimiento	El seguimiento es el aspecto más relevante de cumplir en el manejo de EPRO, este debe llevarse a cabo por un mínimo de 15 días, durante este periodo se pueden identificar manifestaciones en el usuario las que se deben notificar como ESAVI.				