

**CONDUCTAS PARA SEGUIR EN EPRO POR VACUNA INFLUVAC LABORATORIO ABBOTT®**

Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
<b>Se administró una dosis (mL) incorrecta</b>	Administración de <b>dosis menor</b> a la indicada.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Si la dosis administrada es cuantificable, se debe administrar volumen faltante durante las primeras 24 hrs. Si la dosis administrada es incuantificable o si error se detecta al día siguiente o posterior, se debe administrar dosis correcta inmediatamente.	No
	Administración de <b>dosis mayor</b> a la indicada.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	No revacunar. Continuar con el esquema con la dosis correcta según corresponda.	Si
<b>Administración de dosis extra</b>	Repetición de una dosis que ya fue administrada.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Seguimiento.	No
<b>Vacuna fuera de fecha de vigencia</b>	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según lote.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Se debe repetir dosis lo antes posible.	No
<b>Intervalo incorrecto</b>	Administración de segunda dosis en un intervalo menor a 4 semanas.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	El intervalo mínimo para considerar una segunda dosis válida es de 24 días, (periodo de gracia ≤4 días) . Si la dosis fuera administrada antes del intervalo mencionado, se debe revacunar en 28 días posterior a la dosis EPRO.	No
<b>Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta</b>	Administración de vacuna a menores de 6 meses.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Seguimiento.	No
<b>Vía de administración incorrecta</b>	Administración de vacuna por una vía distinta a la indicada por fabricante.	Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Tipo de EPRO		Indicación			
<b>No se respetó una contraindicación de la vacuna</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Vacuna fuera de rango de temperatura</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Administración de vacuna en sitio de punción incorrecto</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			