

## CONDUCTAS PARA SEGUIR EN EPRO POR VACUNA JYNNEOS (INTRADÉRMICA)

### Conductas para seguir en EPRO por vacuna Jynneos (intradérmica)

Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
Se administró una dosis (mL.) incorrecta	Administración de dosis <b>menor</b> a la indicada (Ej.: derrame, filtración, menor extracción desde el vial).	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	<b>Si la dosis administrada es cuantificable</b> , se debe administrar volumen faltante durante las primeras 24 hrs.	Si
	Administración de dosis <b>mayor</b> a la indicada.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	<b>Si la dosis administrada es incuantificable</b> se debe repetir dosis correcta inmediatamente, en sitio distinto a dosis EPRO.	No
Vacuna fuera de fecha de vigencia	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según descongelación y/o lote.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
Administración de dosis extra	Repetición de una dosis ya administrada del esquema.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Seguimiento.	No
Intervalo incorrecto	Administración de segunda dosis en un intervalo <b>menor</b> a 28 días.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Si el intervalo de vacunación es menor a 24 días, se debe repetir dosis 28 días después de la dosis EPRO.	No
	Administración de segunda dosis en un intervalo <b>mayor</b> a 28 días.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	No	No reiniciar esquema, administrar segunda dosis lo antes posible.	Si
Vía de administración incorrecta	Administración de vacuna por una vía distinta a la indicada por fabricante (Ej.: vía intramuscular)	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	No se debe repetir dosis, realizar seguimiento.	Si
Tipo de EPRO		Indicación			
No se respetó una contraindicación de la vacuna		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Vacuna fuera de rango de temperatura		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Coadministración con otras vacunas sin respetar intervalo		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
Administración de vacuna en sitio de punción incorrecto		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			