

**CONDUCTAS PARA SEGUIR EN EPRO POR VACUNA JYNNEOS (SUBCUTÁNEA)**

Conductas para seguir en EPRO por vacuna Jynneos (subcutánea)					
Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
<b>Se administró una dosis (mL.) incorrecta</b>	Administración de dosis menor a la indicada (Ej.: derrame, filtración, menor extracción desde el vial, se administró 0,1 mL por vía subcutánea).	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	<b>Si la dosis administrada es cuantificable</b> , se debe administrar volumen faltante durante las primeras 24 hrs.	Si
				<b>Si la dosis administrada es incuantificable</b> se debe repetir dosis correcta inmediatamente, en sitio distinto a dosis EPRO.	No
<b>Vacuna fuera de fecha de vigencia</b>	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según descongelación y/o lote.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
<b>Administración de dosis extra</b>	Repetición de una dosis ya administrada del esquema.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Seguimiento.	No
<b>Intervalo incorrecto</b>	Administración de segunda dosis en un intervalo menor a 28 días.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Si el intervalo de vacunación es menor a 24 días, se debe repetir dosis 28 días después de la dosis EPRO.	No
	Administración de segunda dosis en un intervalo mayor a 28 días.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	No	No reiniciar esquema, administrar segunda dosis lo antes posible.	Si
<b>Vía de administración incorrecta</b>	Administración de vacuna por una vía distinta a la indicada por fabricante (Ej.: vía intramuscular)	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	No se debe repetir dosis, realizar seguimiento.	Si
Tipo de EPRO		Indicación			
<b>No se respetó una contraindicación de la vacuna</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Vacuna fuera de rango de temperatura</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Coadministración con otras vacunas sin respetar intervalo</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			
<b>Administración de vacuna en sitio de punción incorrecto</b>		Solicitar orientación con PNI para evaluar antecedentes.			