

VACUNA DEL LABORATORIO PFIZER-BIONTECH BIVALENTE (DESDE LOS 12 AÑOS)

| Tipo de EPRO | Descripción del evento | Seguridad | ¿Notificación? | Indicación | ¿Dosis válida? |
|---|---|---|----------------|---|----------------|
| Se administró una dosis (mL) incorrecta | Administración de dosis menor a la indicada (Ej.: derrame, filtración, menor extracción desde el vial, etc.). | Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna. | Si | Si la dosis administrada es cuantificable, se debe administrar el volumen faltante durante las primeras 24 hrs. | No |
| | | | | Si el error se detecta al día siguiente o posterior, se debe administrar dosis correcta a la brevedad. | |
| | | | | Si la dosis administrada es incuantificable, se debe administrar dosis correcta inmediatamente. | |
| | Administración de dosis mayor a la indicada. | Podría presentar aumento de la reactogenicidad local. | Si | No se debe repetir la dosis. | Si |
| | Administración de vacuna mezclada con algún diluyente | Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna. | Si | Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO. | No |
| Administración de dosis extra | Repetición de una dosis ya administrada del esquema | Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna. | Si | Realizar seguimiento, registrar dosis como EPRO en RNI | No |
| Vía de administración incorrecta | Administración de vacuna por una vía distinta a la indicada por fabricante (Ej.: vía subcutánea). | Podría presentar aumento de la reactogenicidad local. | Si | No se debe repetir dosis, realizar seguimiento. | Si |
| Vacuna fuera de fecha de vigencia | Administración de vacuna posterior a 12 horas desde la primera punción del tapón. | Podría presentar aumento de la reactogenicidad local. | Si | Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO. | No |
| | Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según descongelación y/o lote. | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta | Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta (menores de 12 años). | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Intervalo incorrecto | Administración de vacuna bivalente en intervalo menor a lo indicado. | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Tipo de EPRO | | Indicación | | | |
| No se respetó una contraindicación de la vacuna | | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso | | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Vacuna fuera de rango de temperatura | | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |
| Administración de excedente del contenido del vial | | Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes. | | | |