

VACUNA DEL LABORATORIO PFIZER MONOVALENTE (FORMULACIÓN PEDIÁTRICA)

Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
Dilución de vacuna de forma incorrecta	Administración de vial multidosis sin diluir	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local	Si	No se debe repetir la dosis	Si
	Dilución del vial con menor cantidad de diluyente	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local	Si	No se debe repetir la dosis	Si
	Dilución del vial con mayor cantidad de diluyente	No se esperan reacciones de mayor magnitud a las descritas en folleto de la vacuna.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
	Uso de diluyente distinto al indicado por el fabricante	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
Se administró una dosis (mL) incorrecta	Administración de dosis menor a la indicada (Ej.: derrame, filtración, menor extracción desde el vial, etc.)	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna	Si	Si la dosis administrada es cuantificable, se debe administrar dosis faltante durante las primeras 24 hrs.	No
				Si el error se detecta al día siguiente o posterior, se debe administrar dosis correcta a la brevedad.	
Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta	Administración de dosis mayor a la indicada	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local	Si	No se debe repetir la dosis	Si
Administración de dosis extra	Repetición de una dosis ya administrada del esquema.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna	Si	Realizar seguimiento, registrar dosis como EPRO en RNI	No
Vacuna fuera de fecha de vigencia	Administración de vacuna posterior a 12 horas desde la primera punción del tapón.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según descongelación y/o lote.	Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Intervalo incorrecto	Administración de dosis de refuerzo en un intervalo menor a lo indicado según grupo objetivo	Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Tipo de EPRO		Indicación			
No se respetó una contraindicación de la vacuna		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Administración de excedente del contenido del vial		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Vacuna fuera de rango de temperatura		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			