

VACUNA DEL LABORATORIO SINOVAC

Tipo de EPRO	Descripción del evento	Seguridad	¿Notificación?	Indicación	¿Dosis válida?
Se administró una dosis (mL) incorrecta	Administración de dosis menor a la indicada (Ej.: derrame, filtración, menor extracción desde el vial, etc.).	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
	Administración de dosis mayor a la indicada.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	No se debe repetir la dosis.	Si
Administración de vacuna a paciente de edad incorrecta	Administración de vacuna en grupo etario no autorizado (menores de 6 meses).	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Realizar seguimiento, registrar dosis como EPRO en RNI y revacunar cuando corresponda según edad mínima de aprobación de uso por el ISP (6 meses).	No
Vacuna fuera de fecha de vigencia	Se administró vacuna posterior a su fecha de expiración según lote.	Podría presentar aumento de la reactogenicidad local.	Si	Se debe repetir dosis en 14 días, posterior a dosis EPRO.	No
	Administración de vacuna posterior a 6 horas desde la primera punción del tapón vial multidosis.				
Administración de dosis extra	Repetición de una dosis ya administrada del esquema.	Las reacciones esperadas corresponden a las descritas por el fabricante en el folleto de la vacuna.	Si	Realizar seguimiento, registrar dosis como EPRO en RNI.	No
Intervalo incorrecto	Administración de vacuna Sinovac en un intervalo menor a lo indicado en LTO.	Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Tipo de EPRO		Indicación			
No se respetó una contraindicación de la vacuna		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Administración de una vacuna en cuarentena o no apta para su uso		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Vacuna fuera de rango de temperatura		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			
Administración de vacuna en sitio de punción incorrecto		Solicitar orientación a equipo EPRO para evaluar antecedentes.			